

## <휴가철 식중독>

### ✓ 식중독 주요 증상

- 식중독 증상은 감염 후 1~72시간 후 나타난다.



### ✓ 식중독 예방법

## 식중독 예방! 이렇게 하세요



## <비브리오 패혈증>

비브리오 불니피쿠스에 오염된 굴, 낙지, 조개 등과 같은 어패류를 익히지 않고 날 것으로 먹었을 때 발생하는 감염병 중 하나입니다. 주로 **6월에서 9월 사이에 많이 발병**되며 **설사나, 오한, 구토감, 혈압저하** 등의 증상과 처음에는 **발진 수포** 등으로 시작하여 심한 경우 **괴사까지 이어지는 피부 병변**을 일으킵니다.

- 특히 만성간질환, 알코올중독, 당뇨병, 암환자, 면역저하환자 등 고위험군 환자들은 패혈증에 걸릴 확률이 높습니다.
- 비브리오 패혈증의 치사율은 30-50%정도로 높습니다.
- 쇼크에 빠지는 경우 회복이 매우 힘들어 상당수 환자들이 발병 후 48시간 이내에 사망합니다

### 비브리오 패혈증의 예방방법



식중독 예방으로  
우리 모두 **안전한 휴가** 보내봐요^\_^